

Fischor 封片剂

产品简介:

切片被夹于载玻片和盖玻片之间, 其间用封固剂加以封闭, 借以隔断切片与外界空气接触, 这一操作过程称为封固, 一方面可保存已染好的片子, 另一方面可利用折射率适宜的封固剂使材料中的组织细胞清楚显示出来。

Leagene Fischor 封片剂主要由甘油、明胶、少量苯酚等组成, 可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号		
	IH0283	IH0283	Storage
Fischor 封片剂	10ml	50ml	4°C
使用说明书	1 份		

自备材料:

- 1、组织样本、载玻片、盖玻片、显微镜

操作步骤(仅供参考):

1、细胞样本

- ①染色结束后, 吸干净液体。
- ②滴加 1~2 滴 Fischor 封片剂载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触 Fischor 封片剂, 尽量避免产生气泡。
- ③显微镜下观察。

2、组织切片

- ①染色完成后, 吸去染色液。
- ②滴 1~2 滴 Fischor 封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片剂, 尽量避免产生气泡。
- ③在显微镜下观察组织切片。

3、其它样品 (如病原真菌、昆虫等)

其它样品参考细胞样本或组织切片进行操作。

注意事项:

- 1、封片样品宜避光保存。
- 2、封片剂在温度较低时呈固态, 使用前须在 37~50°C 温浴, 并在完全溶解后使用。

- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月有效。常温运输，4℃保存。

相关产品：

产品编号	产品名称
DH0005	Mayer 苏木素染色液
IH0091	多聚赖氨酸溶液(10×PLL,1mg/ml)
IH0142	PBS 磷酸盐缓冲液(0.01mol/L,pH7.2-7.4)
IH0270	甘油明胶封固液
IH0305	柠檬酸钠抗原修复液(50×)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)